WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7: WO 00/42064 (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: C07K 7/02, 14/025, A61K 38/10, C07K A1 (43) Internationales 14/47

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/00141

- (22) Internationales Anmeldedatum: 12. Januar 2000 (12.01.00)
- (30) Prioritätsdaten:

199 01 008.0

13. Januar 1999 (13.01.99)

DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser **DEUTSCHES** KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS [DE/DE]; Im Neuenheimer Feld 280, D-69120 Heidelberg (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BUTZ, Karin [DE/DE]; Weinheimer Strasse 7, D-69493 Hirschberg (DE). HOPPE-SEYLER, Felix [DE/DE]; Hirtenaue 38, D-69118 Heidelberg (DE).
- (74) Anwalt: HUBER, Bernard; Huber & Schüssler, Truderinger Strasse 246, D-81825 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

20. Juli 2000 (20.07.00)

Veröffentlicht

Veröffentlichungsdatum:

NL, PT, SE).

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

- (54) Title: PEPTIDES FOR INHIBITING HPV E6 PROTEINS
- (54) Bezeichnung: PEPTIDE ZUR INHIBIERUNG VON HPV E6-PROTEINEN

(57) Abstract

The invention relates to peptides which are suitable for inhibiting HPV E6 proteins, to DNAs coding them and to the use of both, especially for eliminating HPV tumour cells.

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft Peptide, die sich zur Inhibierung von HPV E6-Proteinen eignen, sie kodierende DNAs und die Verwendung beider, insbesondere zur Eliminierung von HPV-Tumorzellen.

BEST AVAILABLE COPY

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Słowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	LT	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	υz	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		Emilia HC
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

WO'00/42064 PCT/DE00/00141 --

Peptide zur Inhibierung von HPV E6-Proteinen

Die vorliegende Erfindung betrifft Peptide, die sich zur Inhibierung von HPV E6-Proteinen eignen, sie kodierende DNAs und die Verwendung beider, insbesondere zur Eliminierung von HPV positiven Zellen, z.B. HPV-Tumorzellen.

5

10

15

20

25

30

Humane Papillomviren (HPVs) sind eng mit der Entwicklung von Karzinomen verbunden. Gut charakterisiert ist die Beteiligung von HPVs der Entstehung des Zervixkarzinoms verschiedene Befunde weisen darauf hin, daß HPVs eine kausale Rolle in der Ätiologie dieses Karzinoms spielen. Auf der molekularen Ebene sind in etwa 95 % der Zervixkarzinom-Biopsien Sequenzen von HPVs, insbesondere HPV 16 und 18, nachweisbar. Die HPV-DNA liegt dabei meist integriert im Genom der Tumorzellen vor. Sie weist häufig Deletionen und/oder Rearrangements auf, wobei sich diese nie auf die frühen HPV-Gene, nämlich die E6- und E7-Gene, beziehen. Diese Gene kodieren für die HPV-Proteine E6 und E7, die für die Entstehung und Manifestierung von HPV-Karzinomen verantwortlich sind. Die HPV-Proteine wirken dabei synergistisch. Andererseits gibt es Hinweise, daß sie auch entgegengesetzte Aktivitäten aufweisen. Beispielsweise induziert das E7-Protein Apoptose, während das E6-Protein eine solche inhibiert. Dies erfolgt dadurch, daß das E6-Protein direkt oder indirekt, d.h. über Ubiquitin-Protein-Ligase E6-AP, an p53 bindet und dieses hemmt, wodurch p53 seine Apoptose-induzierende Aktivität nicht mehr entfalten kann. Desweiteren besitzt das E6-Protein auch eine p53 unabhängige anti-apoptotische Aktivität. Die Gene der E6- und E7-Proteine werden über polycistronische mRNAs exprimiert, wobei die Transkription unter der Kontrolle eines gemeinsamen Promotors steht. Es sind Versuche bekannt, letzteren bzw. E6-/E7 mRNAs zu inhibieren. Diese Versuche führten zu einer partiellen Inhibierung des Wachstums von HPV-

WO 00/42064 PCT/DE00/00141 --

2

Tumorzellen. Eine Eliminierung solcher Zellen, was sehr erwünscht ist, konnte damit aber nicht erreicht werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Mittel bereitzustellen, mit dem HPV-Tumorzellen, eliminiert werden können.

Erfindungsgemäß wird dies durch die Gegenstände in den Patentansprüchen erreicht.

10

15

20

25

Der Anmelder hat erkannt, daß HPV E6-Proteine an kurze Peptide binden. Er hat eine randomisierte Oligopeptid-Bibliothek, die zufallsgenerierte Peptid-Sequenzen umfaßt, mit einem "Peptid-Aptamer-System" gescreent, in dem das HPV-E6-Protein als Screening-Probe verwendet wurde. Hierbei hat er gefunden, daß kurze Peptide, insbesondere die in Tabelle 1 aufgeführten, HPV E6-Proteine binden. Ferner hat er erkannt, daß sich diese Peptide eignen, Aktivitäten von HPV E6-Proteinen, z.B. ihre anti-apoptotische Aktivität, zu inhibieren. Des weiteren hat er erkannt, daß durch diese Inhibierung eine Eliminierung von HPV-positiven Zellen, insbesondere HPV-Tumorzellen, erreicht werden kann.

Erfindungsgemäß werden die Erkenntnisse des Anmelders genutzt, ein Peptid bereitzustellen, das aus den in Tabelle 1 aufgelisteten Peptiden ausgewählt ist, wobei das Peptid eine Modifikation in der Sequenz von bis zu 40 %, insbesondere 20 % und ganz besonders 10 %, aufweisen kann.

30 Tabelle 1

	E61-1.pep:	NH2-GALVHKLFSQ TSGSCLVCIS-COOH
	E61-2.pep:	NH2-LDVLGCLVRR LGVVLVGLH-COOH
	E61-3.pep:	NH2-CYVECGCEVL TALVNGVRVL-COOH
35	E61-5.pep:	NH2-GVGGLCSCAS CVSEDFYASV-COOH
	E61-7.pep:	NH2-IDLLRRLSQ LHLLLVSVGG-COOH
	E61-8.pep:	NH2-LAVLLNGYTRAIVGISFGGW-COOH
	E61-9c.pep:	NH2-LCTMCATVFR PLLVWFWSIW-COOH

WO 00/42064 PCT/DE00/00141 --

3

	E61-10.pep:	NH_2 -QLLLDLLLGS	YEGMSLTSSP-COOH
	E61-11.pep:	$\mathrm{NH_2} ext{-}\mathrm{SRSNALHTLD}$	VLLGGT-COOH
	E61-12.pep:	$\mathrm{NH_2} ext{-}\mathrm{GGAVYLCDAG}$	CCFYCCGCSG-COOH
	E61-13.pep:	$\mathrm{NH_2}\text{-}\mathrm{CLELFDDLFL}$	ALSLLLLVGG-COOH
5	E61-14.pep:	$\mathrm{NH_2}\text{-PLCRTCLIES}$	AVLIQLSRL-COOH
	E61-15.pep:	${\rm NH_2\text{-}VFSGVYYAEF}$	VFAASAGGTP-COOH
	E61-16.pep:	${\rm NH_2\text{-}MAPVGAGRPC}$	CTVCFLTARF-COOH
	E61-17.pep:	$\mathrm{NH_2}\mathrm{-LSMLLFAAKL}$	PVAVLCSWQA-COOH
	E61-19.pep:	${\rm NH_2\text{-}LVGRVRIGVS}$	VFIRGGRLL-COOH
10	E61-20.pep:	NH2-LFDIFRLCAQI	PVLVHGHTRV-COOH

15

20

25

30

35

Erfindungsgemäße Peptide eignen sich HPV E6-Proteine zu binden und in ihren Aktivitäten, z.B. in ihrer anti-apoptotischen Aktivität, zu inhibieren.

Der Ausdruck "HPV E6-Proteine" umfaßt ein E6-Protein jeglichen HPV-Typs, insbesondere von HPV1, 5, 6, 11, 16, 18, 31, 33 oder 35. Ein E6-Protein kann eine Wildtyp-Sequenz oder eine hiervon durch ein oder mehrere Aminosäuren unterschiedliche Sequenz aufweisen. Ferner kann es in verkürzter Form vorliegen, d.h. es liegt nur in Form jenes Fragments vor, das für die Bindung an p53, Ubiquitin-Protein-Ligase E6-AP oder einen anderen Bindungspartner des E6-Proteins notwendig ist. Das Fragment kann auch in Mehrfachkopien innerhalb eines Polypeptid-Moleküls vorliegen. Des weiteren kann ein E6-Protein bzw. ein

Erfindungsgemäße Peptide können durch übliche Verfahren, in denen Peptide hinsichtlich ihrer Bindung an HPV E6-Proteine getestet werden, bereitgestellt werden. Solche Verfahren sind z.B. das "Peptid-Aptamer-" oder "Bakteriophagen-Display"-Verfahren. Günstig ist es, das in den Beispielen beschriebene "Peptid-Aptamer"-Verfahren zu verwenden, das eine Modifizierung des vorstehend erwähnten Verfahrens ist.

Fragment davon in Form eines Fusionsproteins vorliegen.

Erfindungsgemäße Peptide können als solche oder in Verbindung mit anderen Stoffen, z.B. (Poly)peptiden, vorliegen. Die Verbindung kann darin bestehen, daß die erfindungsgemäßen

Peptide über Linker, z.B. Disulfidbrücken, mit den (Poly) peptiden verbunden sind. Auch können die erfindungsgemäßen Peptide mit den (Poly) peptiden fusioniert sein, wodurch die erfindungsgemäßen Peptide in Form von Fusions (poly) peptiden vorliegen. Als (Poly) peptide für Fusions (poly) peptide bieten sich z.B. "Leader"-Peptide, wie Penetratin von Drosophila Antennapedia oder VP22 von HSV1 an, welche die Aufnahme der erfindungsgemäßen Peptide in Zellen fördern. Andererseits können Polypeptide, die über Linker mit dem erfindungsgemäßen Peptid verbunden sind, z.B. Trägerproteine, wie Transferrin sein, die im Körper als nicht fremd angesehen werden. Auch können mehrere erfindungsgemäße Peptide gleichzeitig in Verbindung mit einem vorstehenden Stoff vorliegen.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Nukleinsäure, insbesondere eine DNA, die für ein erfindungsgemäßes Peptid kodiert. Eine solche DNA kann in Vektoren, insbesondere Expressionsvektoren vorliegen. Beispiele solcher sind dem Fachmann bekannt. Im Falle eines Expressionsvektors für E. coli sind dies z.B. pGEMEX, pUC-Derivate, pGEX-2T, pET3b oder pQE-8. Für die Expression in Hefe sind z.B. pY100 oder Ycpad1 zu nennnen, während für die Expression in tierischen Zellen z.B. pKCR, pEFBOS, cDM8 oder pCEV4 anzugeben sind. Für die Expression in Insektenzellen eignet sich besonders der Bacculovirus-Expressionsvektor pAcSGHisNT-A. Ferner können für die Expression in tierischen Zellen Viren, z.B. Adenovirus, Vaccinia-Virus, Adeno-assoziierter Virus (AAV) oder Retroviren, wie MoMuLV, HaMuSV, MuMTV, RSV oder GaIV), verwendet werden.

30

35

5

10

15

20

25

Der Fachmann kennt geeignete Zellen, um die erfindungsgemäße, in einem Expressionsvektor vorliegende DNA zu exprimieren. Beispiele solcher Zellen umfassen die E.coli-Stämme HB101, DH1, x1776, JM101, JM109, BL21 und SG 13009, den Hefe-Stamm Saccharomyces cerevisiae und die tierischen Zellen L, NIH 3T3, FM3A, CHO, COS, Vero und HeLa sowie die Insektenzellen sf9.

Der Fachmann weiß, in welcher Weise die erfindungsgemäße DNA

WO 00/42064 PCT/DE00/00141 -

in einen Expressionsvektor inseriert werden muß. Ihm ist auch bekannt, daß diese DNA in Verbindung mit einer für ein anderes Peptid bzw. Polypeptid kodierenden DNA inseriert werden kann, so daß die erfindungsgemäße DNA in Form eines Fusionspolypeptids exprimiert werden kann.

Des weiteren kennt der Fachmann Bedingungen, transformierte bzw. transfizierte Zellen zu kultivieren. Auch sind ihm Verfahren bekannt, das durch die erfindungsgemäße DNA exprimierte Peptid bzw. Fusionspolypeptid zu isolieren und zu reinigen.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein gegen ein vorstehendes Peptid bzw. Fusionspolypeptid gerichteter Antikörper. Ein solcher Antikörper kann durch übliche Verfahren hergestellt werden. Er kann polyklonal bzw. monoklonal sein. Zu seiner Herstellung ist es günstig, Tiere, insbesondere Kaninchen oder Hühner für einen polyklonalen und Mäuse für einen monoklonalen Antikörper, mit einem vorstehenden (Fusions)polypeptid oder Fragmenten davon zu immunisieren. Weitere "Booster" der Tiere können mit dem gleichen (Fusions)polypeptid oder Fragmenten davon erfolgen. Der polyklonale Antikörper kann dann aus dem Serum bzw. Ei der Tiere erhalten werden. Für den monoklonalen Antikörper werden Milzzellen der Tiere isoliert und mit Myelomzellen fusioniert.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine pharmazeutische Zusammensetzung, die ein oder mehrere der erfindungsgemäßen Peptide und/oder sie kodierende DNAs sowie übliche Hilfsstoffe enthält. Als Hilfsstoffe können z.B. Arzneimittelträger, Bindemittel, Sprengmittel, Gleitmittel, Lösungsmittel, Lösungsmittelvermittler, Freigabe-Beschleuniger, Freigabe-Verzögerer, Emulgatoren, Stabilisatoren, etc. verwendet werden. Eine solche Zusammensetzung kann in üblicher Weise, z.B. oral oder parenteral, verwendet werden. Die geeignete Dosierung wird für den Einzelfall in üblicher Weise bestimmt.

WO 00/42064 PCT/DE00/00141

5

10

15

20

25

30

6

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine diagnostische Zusammensetzung, die ein oder mehrere erfindungsgemäße Peptide enthält. Mit einer solchen Zusammensetzung können HPV E6-Proteine nachgewiesen werden. Dies kann genutzt werden, um HPV-assoziierte Erkrankungen, wie HPV-Infektionen, HPV-Dysplasien oder HPV-Karzinome, nachzuweisen. Ein solcher Nachweis beinhaltet beispielsweise Gewinnung einer Zellprobe von einem Patienten, Inkontaktbringung der Zellprobe mit einem erfindungsgemäßen Peptid unter Bedingungen, welche die spezifische Bindung des Peptids an ein HPV E6-Protein erlauben, und (c) Nachweis des Peptids. Dieser Nachweis kann durch Standardverfahren erfolgen. Beispielsweise können die erfindungsgemäßen Peptide in Flüssigphase vorliegen oder an einen festen Träger gebunden werden und auf verschiedene Art und Weise markiert sein. Geeignete Marker und Markierungsverfahren sind dem Fachmann bekannt. Auch können die Peptide durch erfindungsgemäße Antikörper nachgewiesen werden. Letztere eignen sich ferner dazu, den Therapieverlauf einer mit erfindungsgemäßen Peptiden behandelten HPV-assoziierten Erkrankung zu kontrollieren.

Mit der vorliegenden Erfindung ist es möglich HPV E6-Proteine zu binden und in ihren Aktivitäten, insbesondere in ihrer anti-apoptotischen Aktivität, zu inhibieren. Damit kann die Eliminierung von HPV-positiven Zellen, insbesondere HPV-Tumorzellen, erreicht werden. Ferner können HPV-positive Zellen diagnostiziert werden. Damit eignet sich die vorliegende Erfindung gegen HPV-assoziierte Erkrankungen, insbesondere HPV-Infektionen, HPV-Dysplasien oder HPV-Karzinome, diagnostisch und therapeutisch vorzugehen. Des weiteren stellen die erfindungsgemäßen Peptide bzw. sie kodierende DNAs eine Basis dar, völlig neue Wirkstoffe gegen vorstehende Erkrankungen zu entwickeln.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen.

zeigt schematisch das modifizierte "Peptid-Aptamer"-Fig. 1 System in S. cerevisiae. Dieses System umfaßt drei 5 Komponenten: (1) das Zielprotein (E6), das mit einer heterologen DNA-Bindungsdomäne (GAL4BD) fusioniert (2) ein Peptid mit randomisierter Aminosäuresequenz, das an eine transkriptionelle Aktivierungsdomäne (GAL4AD) fusioniert ist und (3) 10 ein stabil integriertes Selektionsgen (prototrophe Selektionsmarker, wie ADE2), das in seinem Promotor die Erkennungssequenz für die DNA-Bindungsdomäne besitzt. Durch Interaktion zwischen dem Peptid und dem Zielprotein entsteht ein synthetischer 15 Transkriptionsfaktor, der durch die Transaktivierungsdomäne an die Erkennungssequenz Promotorbereich des Selektionsgens bindet und durch die Transaktivierungsdomäne die Transkription des Selektionsgens stimuliert. Unter Selektions-20 bedingungen (z.B. Adenin-negativen Nährböden) bilden nur jene Hefezellen Kolonien, die ein Peptid mit Affinität für das Zielprotein exprimieren (TrxA = E.coli Thioredoxin A; TAG = Influenza Virus HA-Tag; NLS = nukleäres Lokalisationssignal).

25

30

35

Fig. 2 zeigt die Analyse von HPV16 E6-bindenden Peptiden im "Peptid-Aptamer"-System. Durch Screening von etwa 2 x 106 Hefezellen werden 15 positive Klone isoliert Tabelle 1, E61-1.pept - E61.-17.pep). Es Replika-Plattierungen werden der Hefekolonien (Masterplatte oben: 1-15 = positive Klone; K = zufällig ausgewählter Kontroll-Klon) unter Selektion auf ADE2 (GAL4-BS im Kontext des GAL2-Promotors), HIS3 (GAL4BS im Rahmen des GAL1-Promotors) und URA3 (GAL4-BS im Rahmen des SPO13-Promotors) durchgeführt.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung.

Beispiel 1: Screening nach HPV E6-Protein bindenden Peptiden

Es wird ein Verfahren verwendet, das sich von dem bekannten "Peptid-Aptamer"-System ableitet. Das Verfahren ist in Fig. 1 schematisch dargestellt.

Für das Screening nach HPV E6-Protein bindenden Peptiden wird eine randomisierte Oligopeptid-Expressionsbank für 20 Aminosäuren-lange Peptide mit zufälliger Sequenz hergestellt (Komplexität ca. 2 x 108 unterschiedliche Peptide). Kodons werden durch die Sequenz NNK definiert (N = G, A, T oder C; K = G oder C). Sie kodieren für alle 20 Aminosäuren, resultieren aber nur in einem Stop-Kodon. Als Expressionsvektor wird ein Hefe-Expressionsvektor, pADTrx, verwendet. Dieser enthält E.coli Trx A (Thioredoxin-Protein) aus pTrx (Invitrogen) und GAL4AD sowie den ADH-Promotor aus pAS2 bzw. pGAD424 (Clontech). Die Peptide werden im Rahmen der aktiven Schleife von Trx exprimiert. Dies hat folgende Vorteile:

20

25

10

15

- im Rahmen der Trx-Schleife ist die Präsentation der Peptide nach außen gewährleistet,
- konformell restringierte Peptide können Aminosäuren nach außen exponieren, die bei flexiblen Peptiden im intrazellulären Milieu möglicherweise nach innen gefaltet werden,
- konformell restringierte Peptide können hochaffine Peptide sein, die das Potential besitzen, auch in vivo als effiziente Proteininhibitoren zu wirken.

30

35

Ferner wird ein Hefestamm, KF-1, verwendet. Dieser stammt von dem Hefe-

stamm PJ69-4A (vgl. James et al., Genetics 144 (1996), 1425) und erlaubt die Analyse von drei Selektionsmarkern: ADE2, HIS3 und URA3. Jeder der drei Selektionsmarker steht unter der transkriptionellen Kontrolle von GAL4-Bindungsstellen im Rahmen unterschiedlicher Promotoren. Der Selektionsmarker URA3 wird durch den SP013-Promotor reguliert, der aus dem Hefestamm

WO 00/42064 PCT/DE00/00141

MaV103 (vgl. Vidal, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA (93), 10315-10320) stammt, ein negativ-regulatorisches Element enthält und durch starke Protein-Protein-Interaktionen aktiviert werden kann. Ferner enthält der Hefestamm das E.coli ß-Galaktosidase-(-Gal)-Gen als weiteren Marker, dessen Aktivität leicht quantifizierbar ist und eine Abschätzung der in vivo Bindungsaffinität des Peptids an das E6-Protein ermöglicht. Auch die Aktivierung des HIS3-Gen kann durch Titration mit 3'AT-(3-Amino- -1, 2, 4-Triazol) quantifiziert werden.

Das HPV16 E6-Protein wird einem Screening mit vorstehendem System unterzogen. Hierzu wird es in Form eines es kodierenden Expressionsvektors bereitgestellt. Als Basisvektor dient pPC97 (vgl. Vidal et al. vorstehend), in dem die kodierende Sequenz eines HPV 16 E6-Proteins inseriert ist. Aus ca. 2 x 106 Hefeklonen werden 15 Klone isoliert, die unter Selektion mit ADE2 ein Wachstum zeigen. Replika-Plattierungen und die Analyse der drei Selektionsmarker zeigen, daß 14 der 15 Klone auch unter Selektion mit HIS3 Wachstum zeigen (Fig. 2). Desweiteren zeigen 6 der isolierten Klone zusätzlich Wachstum unter URA3-Selektion, was unter den hier eingesetzten Bedingungen auf eine besonders hohe in vivo Affinität des entsprechenden Peptids für das HPV E6-Protein hinweist.

25

30

5

10

15

20

Zur weiteren Kontrolle werden aus den 15 Klonen die entsprechenden Peptid-Expressionsplasmide isoliert und nach erneuter Transformation in Hefe einem Rescreening unterzogen. Das Rescreening zeigt eine komplette Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus den vorstehenden Replika-Plattierungen (Fig. 2). Es zeigt sich, daß das Wachstum der Hefe von der Bindung der Peptide an das HPV16 E6-Protein abhängt.

Die Peptide der 15 Klone werden in ihrer Aminosäuresequenz bestimmt. Diese ist in Tabelle 1, E61-1.pep - E61-17.pep angegeben. Ein Teil der Peptide zeigt Sequenzhomologieen zu den untereinander verwandten Bindungsdomänen der E6-bindenden Proteine E6-AP, E6-BP und Paxillin ("LhXΦLs-" ähnliche Motive, 5

10

15

20

25

30

35

geben.

wobei: h = Q, E oder N; X = jede beliebige Aminosäure; $\Phi = h$ ydrophobe Aminosäure; s = kleine Aminosäure wie G oder A und - = saure Aminosäure. Der andere Teil der E6-bindenden Peptide weist keine offensichtlichen Sequenz-Ähnlichkeiten zu den vorstehenden E6-bindenden Proteinen auf. Ihre Sequenzen können jedoch Hinweise auf bislang unbekannte E6-Interaktionspartner

PCT/DE00/00141 --

In einem weiteren Screening-Ansatz werden zwei weitere Klone erhalten. Ihre Aminosäuresequenz ist in Tabelle 1, E61-19.pep und E61-20.pep angegeben.

Beispiel 2: Inhibierung der anti-apoptotischen Aktivität von HPV E6-Proteinen durch erfindungsgemäße Peptide.

Es wird das "VP 22-Shuttle-System" verwendet. Dieses beruht darauf, daß das HSV1-VP 22-Protein von Zellen aufgenommen wird, d.h. als Träger verwendet werden kann. Es werden Fusionspolypeptide aus VP 22 und erfindungsgemäßen Peptiden von Tabelle 1 hergestellt. Hierzu wird der Expressionsvektor pCEP4 (Invitrogen) verwendet. In diesen werden die DNA-Sequenzen der vorstehenden Peptide in Phase mit der DNA-Sequenz von VP 22 inseriert. Die Peptide werden dabei im Rahmen des E. Coli TrxA-Proteins exprimiert. Die erhaltenen Expressionsplasmide pCEP4/E61-1.pep bzw. pCEP4/E61-2.pep werden in HPV16 positive SiHa bzw. CaSKi-Zervixkarzinom-Zellen transfiziert. Zu verschiedenen Zeitpunkten wird die Morphologie der Zellen und ihr Wachstum durch übliche Verfahren untersucht.

Es zeigt sich, daß durch die erfindungsgemäßen Peptide die anti-apoptotische Aktivität von HPV E6-Proteinen inhibiert werden kann. Ferner zeigt sich, daß die durch HPV E7-Proteine induzierte Apoptose erhalten wird. Dies spiegelt sich auch in "Colony-Formation-Assays" wieder, die eine starke Wachstumsinhibition der Zellen zeigen. Somit eignet sich ein erfindungsgemäßes Peptid HPV-positive Zellen, insbesondere

WO'00/42064 PCT/DE00/00141 --

11

HPV-Tumorzellen, zu eliminieren.

35

Patentansprüche

1. Peptid, ausgewählt aus den folgenden Peptiden

5 NH2-GALVHKLFSQ TSGSCLVCIS-COOH NH2-LDVLGCLVRR LGVVLVGLH-COOH NH2-CYVECGCEVL TALVNGVRVL-COOH NH2-GVGGLCSCAS CVSEDFYASV-COOH 10 NH2-IDLLRRLGSQ LHLLLVSVGG-COOH NH₂-LAVLLNGYTRAIVGISFGGW-COOH NH2-LCTMCATVFR PLLVWFWSIW-COOH NH2-QLLLDLLLGS YEGMSLTSSP-COOH NH2-SRSNALHTLD VLLGGT-COOH 15 NH2-GGAVYLCDAG CCFYCCGCSG-COOH NH2-CLELFDDLFL ALSLLLLVGG-COOH NH2-PLCRTCLIES AVLIQLSRL-COOH NH2-VFSGVYYAEF VFAASAGGTP-COOH NH2-MAPVGAGRPC CTVCFLTARF-COOH 20 NH2-LSMLLFAAKL PVAVLCSWQA-COOH NH2-LVGRVRIGVS VFIRGGRLL-COOH NH_2 -LFDIFRLCAQPVLVHGHTRV-COOH

wobei das Peptid eine Modifikation in der Sequenz von bis zu 40 % aufweisen kann.

- Peptid nach Anspruch 1, wobei das Peptid als Fusionspolypeptid vorliegt.
- 30 3. Peptid nach Anspruch 2, wobei das Fusionspolypeptid eine "Leader"-Sequenz umfaßt.
 - 4. DNA, kodierend für das Peptid nach einem der Ansprüche 1 3.
 - 5. Expressionsvektor, enthaltend die DNA nach Anspruch 4.
 - 6. Antikörper, gerichtet gegen das Peptid nach einem der

PCT/DE00/00141 --

Ansprüche 1-9.

5

10

7. Zusammensetzung, umfassend ein oder mehrere Peptide nach einem der Ansprüche 1 - 3, ein oder mehrere Expressionsvektoren nach Anspruch 5 und/oder einen oder mehrere Antikörper anch Anspruch 6 sowie übliche Hilfsstoffe.

13

- 8. Zusammensetzung nach Anspruch 7, wobei das Peptid als Fusionspolypeptid vorliegt.
- 9. Zusammensetzung nach Anspruch 8, wobei das Fusionspolypeptid eine "Leader"-Sequenz umfaßt.
- 10. Verwendung des Peptids nach einem der Ansprüche 1 3,
 15 des Expressionsvektors nach Anspruch 5 oder der Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 7 9 zur Inhibierung eines HPV E6-Proteins.
- 11. Verwendung nach Anspruch 10, wobei die Inhibierung eine20 Eliminierung von HPV-positiven Zellen umfaßt.
 - 12. Verwendung nach Anspruch 11, wobei die HPV-positiven Zellen von einer HPV-assoziierten Erkrankung stammen.
- 25 13. Verwendung nach einem der Ansprüche 9 11, wobei die Inhibierung des HPV E6-Proteins zur Behandlung von HPVassoziierten Erkrankungen erfolgt.
- 14. Verwendung nach Anspruch 12 oder 13, wobei die HPV-30 assoziierte Erkrankung eine HPV-Infektion, eine HPV-Dysplasie und ein HPV-Karzinom umfaßt.
- 15. Verwendung nach einem der Ansprüche 10-14, wobei HPV HPV1, HPV5, HPV6, HPV11, HPV16, HPV18, HPV 31, HPV 33 und HPV 35 umfaßt.

1/2




Fig. 1

WO'00/42064

2/2




Fig. 2

PCT/DE00/00141 -

1

SEQUENZPROTOKOLL

- (1) ALLGEMEINE ANGABEN:
 - (i) ANMELDER:
 - (A) NAME: Deutsches Krebsforschungszentrum
 - (B) STRASSE: Im Neuenheimer Feld 280
 - (C) ORT: Heidelberg
 - (E) LAND: Deutschland
 - (F) POSTLEITZAHL: 69120
- (ii) BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG: Peptide zur Inhibierung von HPV E6-Proteinen
 - (iii) ANZAHL DER SEQUENZEN: 17
 - (iv) COMPUTER-LESBARE FASSUNG:
 - (A) DATENTRÄGER: Floppy disk

 - (B) COMPUTER: IBM PC compatible (C) BETRIEBSSYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
 - (D) SOFTWARE: PatentIn Release #1.0, Version #1.30 (EPA)
 - (v) DATEN DER JETZIGER ANMELDUNG: ANMELDENUMMER: DE 199 01 008.0
- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 1:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 20 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 - (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEO ID NO: 1:
 - Gly Ala Leu Val His Lys Leu Phe Ser Gln Thr Ser Gly Ser Cys Leu
 - Val Cys Ile Ser
- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 2:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 19 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 - (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEO ID NO: 2:
 - Leu Asp Val Leu Gly Cys Leu Val Arg Arg Leu Gly Val Val Leu Val
 - Gly Leu His

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 3:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 20 Aminosäuren

 - (B) ART: Aminosäure (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 - (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 3:

Cys Tyr Val Glu Cys Gly Cys Glu Val Leu Thr Ala Leu Val Asn Gly
1 5 10 15

Val Arg Val Leu

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 4:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 20 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 - (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 4:

Gly Val Gly Gly Leu Cys Ser Cys Ala Ser Cys Val Ser Glu Asp Phe 1 5 10

Tyr Ala Ser Val

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 5:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 19 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 - (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 5:

Ile Asp Leu Leu Arg Arg Leu Ser Gln Leu His Leu Leu Leu Val Ser

Val Gly Gly

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 6:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 20 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt(D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 6:

Leu Ala Val Leu Leu Asn Gly Tyr Thr Arg Ala Ile Val Gly Ile Ser 10

Phe Gly Gly Trp

- (2). ANGABEN ZU SEQ ID NO: 7:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 20 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 - (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 7:

Leu Cys Thr Met Cys Ala Thr Val Phe Arg Pro Leu Leu Val Trp Phe

Trp Ser Ile Trp

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 8:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 20 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 - (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEO ID NO: 8:

Gln Leu Leu Asp Leu Leu Gly Ser Tyr Glu Gly Met Ser Leu

Thr Ser Ser Pro

20

4

(2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 9:

- (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 16 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 - (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
- (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
- (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 9:

Ser Arg Ser Asn Ala Leu His Thr Leu Asp Val Leu Leu Gly Gly Thr

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 10:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 20 Aminosäuren

 - (B) ART: Aminosäure (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 - (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 10:

Gly Gly Ala Val Tyr Leu Cys Asp Ala Gly Cys Cys Phe Tyr Cys Cys

Gly Cys Ser Gly

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 11:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 20 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 11:

Cys Leu Glu Leu Phe Asp Asp Leu Phe Leu Ala Leu Ser Leu Leu Leu

Leu Val Gly Gly

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 12:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 19 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt

- (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
- (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
- (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 12:

Pro Leu Cys Arg Thr Cys Leu Ile Glu Ser Ala Val Leu Ile Gln Leu

Ser Arg Leu

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 13:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 20 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 13:

Val Phe Ser Gly Val Tyr Tyr Ala Glu Phe Val Phe Ala Ala Ser Ala

Gly Gly Thr Pro

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 14:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 20 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 14:

Met Ala Pro Val Gly Ala Gly Arg Pro Cys Cys Thr Val Cys Phe Leu
1 10 15

Thr Ala Arg Phe

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 15:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 20 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 - (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt

6

- (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
- (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 15:

Leu Ser Met Leu Leu Phe Ala Ala Lys Leu Pro Val Ala Val Leu Cys

Ser Trp Gln Ala

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 16:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 19 Aminosäuren
 - (B) ART: Aminosäure
 - (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 - (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 16:

Leu Val Gly Arg Val Arg Ile Gly Val Ser Val Phe Ile Arg Gly Gly
1 15

Arg Leu Leu

- (2) ANGABEN ZU SEQ ID NO: 17:
 - (i) SEQUENZKENNZEICHEN:
 - (A) LÄNGE: 20 Aminosäuren

 - (B) ART: Aminosäure (C) STRANGFORM: nicht bekannt
 - (D) TOPOLOGIE: nicht bekannt
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: Peptid
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 17:

Leu Phe Asp Ile Phe Arg Leu Cys Ala Gln Pro Val Leu Val His Gly

His Thr Arg Val

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter Anal Application No

			7/00141
A CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C07K7/02 C07K14/025 A61K38/	10 C07K14/47	
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	eation and IPC	
	SEARCHED		
Minimum do	commentation searched (classification system followed by classificat $C07K$	tion symbols)	
	tion searched other than minimum documentation to the extent that		:
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	ase and, where practical, search terms use	d)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.
A	WO 97 18309 A (NEW ENGLAND MEDIC INC) 22 May 1997 (1997-05-22) claim 1	AL CENTER	1
A	WO 96 02000 A (NEW ENGLAND MEDIC INC) 25 January 1996 (1996-01-25 claim 1		1
Α	US 5 532 348 A (HUIBREGTSE JON M 2 July 1996 (1996-07-02) claim 1	ET AL)	1
	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
"A" docume	tegories of cited documents : Int defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	"T" later document published after the into or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the	the application but
"E" earlier d	locument but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the	claimed invention
Which I	ate It which may throw doubts on priority claim(s) or s cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the di "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in	t be considered to ocument is taken alone claimed invention
other n	nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or neans nt published prior to the international filling date but	document is combined with one or m ments, such combination being obvio in the art.	ore other such docu-
later th	an the priority date claimed	"&" document member of the same patent	
	9 June 2000	Date of mailing of the international se	erch report
Name and m	nailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni,		
	Fax: (+31-70) 340-3016	Deffner, C-A	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter. nal Application No
PCT/DE 00/00141 ...

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
WO 9718309	A	22-05-1997	US AU CA EP	5989804 A 7737296 A 2237783 A 0866857 A	23-11-1999 05-06-1997 22-05-1997 30-09-1998
WO 9602000	A	25-01-1996	AU JP US US	2866695 A 10511843 T 5989804 A 5821051 A	09-02-1996 17-11-1998 23-11-1999 13-10-1998
US 5532348	A	02-07-1996	US	5914389 A	22-06-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interi nales Aktenzeichen
PCT/DF 00/00141 ...

		101/05 00/001	41 6
A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C07K7/02 C07K14/025 A61K38/1	10 C07K14/47	
		33.112.7, 17	
	temationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla RCHIEPTE GEBIETE	ssifikation und der IPK	
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ole)	
IPK 7	CO7K	,	
			į
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen	
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	Jama dar Datasbank und auf un auguste. Cushk-	
	The state of the s	ASTRA COL DECEMBER OF THE SAIL ASTRACTOR SECTION	gnite)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Α	WO 97 18309 A (NEW ENGLAND MEDICA	AL CENTER	1
	INC) 22. Mai 1997 (1997-05-22) Anspruch 1		
	7.113pi den 1		
A	WO 96 02000 A (NEW ENGLAND MEDICA		1
	INC) 25. Januar 1996 (1996-01-25)).	
	Anspruch 1		
A	US 5 532 348 A (HUIBREGTSE JON M	FT AL)	₁
	2. Juli 1996 (1996-07-02)	ET AE	•
	Anspruch 1		
		İ	
		1	
		}	
		ļ	İ
	No. Markitanillahungan sind da 5 and an 5 and 5		
entre	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internal oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden	tionalen Anmeldedatum
aberni	cht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum V Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder de	erständnis des der
Anmelo	Ookument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; di	1
ochoin/	nicituig, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweitelnatier-	kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung in	icht als neu oder auf
andere soll ode	n im Recherchenbericht genarnten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; di kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit berui	e beanspruchte Erfindung
O Veröffer	unrt) ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	werden, wenn die Veröffentlichung mit einer od Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbind	ier mehreren anderen
"P" Veröffen	enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht mitchung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen Fachmann nahelle	gend ist
gem be	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Schlusses der internationalen Recherche	*& * Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patenti	
		Absendedatum des Internationalen Recherche	noerionis
19	9. Juni 2000	27/06/2000	
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde		
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Doffnor C-A	
	Fax: (+31-70) 340-3016	Deffner, C-A	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern ales Aktenzeichen
PCT/DE 00/00141

lm Recherchenberic ngeführtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9718309	A	22-05-1997	US AU CA EP	5989804 A 7737296 A 2237783 A 0866857 A	23-11-1999 05-06-1997 22-05-1997 30-09-1998
WO 9602000	A	25-01-1996	AU JP US US	2866695 A 10511843 T 5989804 A 5821051 A	09-02-1996 17-11-1998 23-11-1999 13-10-1998
US 5532348	Α	02-07-1996	US	5914389 A	22-06-1999

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.